

Vázquez-Covarrubias¹, D.A.

1.-Escuela Nacional de Ciencias Biológicas – IPN. email: werocovarrubias@hotmail.com



Familia: Passeridae

Género: *Passer*

Especie: *Passer domesticus*

Nombre común: Gorrión inglés

Descripción. Es una ave que mide entre 14.5 y 15.5 cm. El macho tiene la parte superior de la cabeza de color gris, garganta negra, mejillas blancas y nuca rojiza; las hembras y los jóvenes no presentan la misma coloración.

Alimentación. Basada principalmente en semillas, aunque consume también insectos y pequeños frutos.

Distribución. Se trata de un gorrión introducido muy común en áreas urbanas y suburbanas. Proviene de Eurasia y norte de África, introducido en América y sur de África y Australia. En México habita en sitios ligados a las poblaciones humanas.

Hábitat. En ciudades, pueblos y granjas.

Cambiar imagen

Familia: Fringillidae

Vázquez-Covarrubias¹, D.A.

1.-Escuela Nacional de Ciencias Biológicas – IPN. email: werocovarrubias@hotmail.com

Género: *Carpodacus*

Especie: *Carpodacus mexicanus*

Nombre común: Gorrión mexicano

Descripción. Ave de 12.5 cm., el macho casi del tamaño de un gorrión doméstico. Parduzco, con parte del pecho, la frente y la rabadilla de color rojo brillante, además de presentar una raya por arriba del ojo también de color rojo. También se observan las variedades de color amarillo y naranja. La hembra es de color castaño grisáceo del dorso, el vientre castaño rallado y el pico relativamente grueso.

Alimentación. Semillas, insectos y frutos pequeños.

Distribución. Desde el sur de Colombia Británica y oeste de E.U.A, hasta México. En México es residente de Baja California; desde los estados fronterizos al oeste y centro, hasta el este de Nuevo León y sur de Tamaulipas; del sur de la vertiente pacífica hasta Nayarit y en las tierras altas hasta el centro de Oaxaca.

Hábitat. Es variado se le puede encontrar en pueblos, ranchos, bosques abiertos, arbustos, áreas costeras, cañones y desiertos.



Familia:Emberizidae

Género: *Pipilo*

Especie: *Pipilo fuscus*

Nombre común: Pájara vieja

Vázquez-Covarrubias¹, D.A.

1.-Escuela Nacional de Ciencias Biológicas – IPN. email: werocovarrubias@hotmail.com

Descripción: Aves medianas, miden entre 19 y 21 cm. Son de color café grisáceo opaco con la cola oscura y larga. Las plumas que cubren la parte inferior de la cola son pálidas y la garganta de color café pálido.

Alimentación: Semillas insectos y frutos pequeños.

Distribución : Desde el sureste de E.U.A hasta el sur de México. En México desde los estados del norte hacia el sur hasta Oaxaca y centro de Veracruz.

Hábitat: Desiertos, zonas arbustivas y pedregosas, bosques abiertos



Género: *Molothrus*

Especie: *Molothrus aeneus*

Nombre común: Tordo de ojo rojo

Descripción: Ave de 16.5 a 22 cm. El macho presenta coloración negruzca y los ojos rojos. En temporada reproductiva tiene las plumas de la nuca alargadas y estas se erizan. La hembra es de menor tamaño parecida al macho pero de color negruzco pálido o gris. Las plumas de la nuca son cortas y están menos erizadas que en el macho.

Alimentación: Insectos, pequeñas frutas, granos, desperdicios y fauna acuática.

Distribución: Desde el sureste de E.U.A. hasta Panamá y Colombia. En México se encuentra ampliamente distribuido desde los estados norteros hasta Chiapas y la península de Yucatán, excepto en Baja California

Hábitat: Zonas de cultivo, arbustos y campos semiabiertos.

Vázquez-Covarrubias¹, D.A.

1.-Escuela Nacional de Ciencias Biológicas – IPN. email: werocovarrubias@hotmail.com



Familia: Icteridae

Género: *Quiscalus*

Especie: *Quiscalus mexicanus*

Nombre común: Zante

Descripción. Los machos miden 42.5 cm; mientras que las hembras miden 32.5 cm. El macho presenta un color negro iridiscente. Las hembras son de plumaje color café. Tiene la cola amplia en forma de abanico. Su ojo puede ser de color blanco o amarillo.

Alimentación. Insectos, pequeñas frutas, semillas, granos de desperdicios, fauna acuática e incluso se les puede ver consumiendo frituras.

Distribución. Desde el suroeste de E.U.A. hasta el norte de Perú. En México se encuentra ampliamente distribuido en todo el país, excepto en Baja California. Desde el nivel del mar hasta los 2750 m., excepcionalmente a los 3760 m. en Paso de Cortés, Estado de México.

Hábitat. Vegetación secundaria, arbustiva, densa; campos de cultivo, granjas, villas, pueblos, parques ciudadanos, manglares y playas lodosas.

Vázquez-Covarrubias¹, D.A.

1.-Escuela Nacional de Ciencias Biológicas – IPN. email: werocovarrubias@hotmail.com



Familia: Mimidae

Género: *Toxostoma*

Especie: *Toxostoma curvirostre*.

Nombre común: Cuitlacoche común.

Descripción. Se trata de aves medianas entre 24 y 29 cm. Con pico curvado de color pardo. Manchado indistinto en el pecho. Ojo naranja claro o rojizo. Base de la mandíbula inferior negruzca.

Alimentación. Basada principalmente en insectos y frutos.

Distribución. Desde el desierto del suroeste de E. U. A. al sur de México (hasta las tierras altas de Oaxaca).