

Cuando ansiamos respuestas lógicas observamos señales. Cada hecho indica algo preciso para iluminar nuestro itinerario.

Explorando la Relatividad Especial

1. Expresión transformada de la energía cinética

Tradicionalmente se recurre al desarrollo en serie para comparar la fórmula relativista de la energía cinética con la fórmula clásica. Hay un modo más directo y más didáctico, que a los estudiantes de todos los niveles les resulta convincente.

Símbolos

T	energía cinética
m	masa en movimiento
m_0	masa en reposo
C	velocidad de la luz en el vacío
v	velocidad del objeto

Transformación

Escribamos las ecuaciones de partida.

$$m_0 = m \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}} \quad (1)$$

$$T = (m - m_0)C^2 \quad (2)$$

En (2) reemplazamos m_0 como indica (1).

$$T = \left(m - m \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}} \right) C^2 \quad (3)$$

Extraemos factor común m .

$$T = m \left(1 - \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}} \right) C^2 \quad (4)$$

En el miembro derecho multiplicamos y dividimos por $\left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right)$.
Después operamos.

$$T = m \frac{\left(1 - \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) \left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right)}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right)} C^2 \quad (5)$$

Aplicamos propiedad distributiva. Después simplificamos.

$$T = m \frac{v^2}{1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}} \quad (6)$$

En (1) despejamos m y aplicamos eso en (6).

$$T = m_0 \frac{v^2}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}} \quad (7)$$

Los estudiantes comprueban que en el límite para $\frac{v}{C} \rightarrow 0$ el denominador tiende a 2, coincidiendo con la fórmula clásica. Eso los tranquiliza.

2. Semejanza con la derivada de un logaritmo

Simbolicemos u a la función siguiente.

$$u = v \cdot \ln \left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) \quad (8)$$

Derivamos.

$$\frac{du}{dv} = \ln \left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) + v \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}} \cdot \frac{(-2v)}{C^2} \quad (9)$$

Simplificamos y ordenamos.

$$\frac{du}{dv} = \ln \left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) - \frac{1}{C^2} \frac{v^2}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}} \quad (10)$$

Hacemos pasaje de términos.

$$\frac{1}{C^2} \frac{v^2}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}} = \ln \left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) - \frac{du}{dv} \quad (11)$$

En (8) dividimos ambos miembros por v .

$$\frac{u}{v} = \ln \left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) \quad (12)$$

En (11) aplicamos (12).

$$\frac{1}{C^2} \frac{v^2}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}} = \frac{u}{v} - \frac{du}{dv} \quad (13)$$

Multiplicamos por $m_0 C^2$ ambos miembros

$$m_0 \frac{v^2}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}\right) \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}} = m_0 C^2 \left(\frac{u}{v} - \frac{du}{dv}\right) \quad (14)$$

Reemplazamos el miembro izquierdo de (14) por T , como indica (7).

$$T = m_0 C^2 \left(\frac{u}{v} - \frac{du}{dv}\right) \quad (15)$$

Siendo T función de v solamente, $\frac{du}{dv}$ es simplemente el cociente incremental.

Expresada en términos de u , la energía cinética existe cuando el cociente común $\frac{u}{v}$ y el cociente incremental $\frac{du}{dv}$ difieren.

3. Propiedades de la función u

La función u tiene dimensiones de velocidad. Es la velocidad observable multiplicada por el logaritmo de 1 más la contracción relativista, como vemos en (8). ¿Podemos atribuirle significado físico a una función así?

Más que discutir ideas, intentemos en primera instancia examinar propiedades matemáticas. Por ejemplo buscar los extremos de u poniendo en (10) $\frac{du}{dv} = 0$.

$$0 = \ln \left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}} \right) - \frac{1}{C^2} \frac{v^2}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}} \right) \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}}} \quad (16)$$

Podemos darle a (16) una forma compacta utilizando el símbolo siguiente.

$$\delta = \ln \left(1 + \sqrt{1 - \frac{v^2}{C^2}} \right) \quad (17)$$

Expresada en función de δ la ecuación (16) toma la forma siguiente.

$$0 = \delta - \frac{1}{C^2} \frac{v^2}{e^\delta (e^\delta - 1)} \quad (18)$$

De (17) despejamos $\frac{v^2}{C^2}$

$$\frac{v^2}{C^2} = e^\delta (2 - e^\delta) \quad (19)$$

Aplicamos a (18) lo indicado en (19). Después simplificamos.

$$0 = \delta - \frac{(2 - e^\delta)}{(e^\delta - 1)} \quad (20)$$

Multiplicamos ambos miembros por $(e^\delta - 1)$

$$0 = \delta (e^\delta - 1) - (2 - e^\delta) \quad (21)$$

Despejamos e^δ

$$e^\delta = \frac{2 + \delta}{1 + \delta} \quad (22)$$

Resolver la ecuación (22) es condición previa para calcular los valores de v asociados con los extremos de la función u .

La definición (8) muestra que para $v = 0$ y para $v = C$, en ambos casos, resulta $u = 0$. Es decir tenemos $u = 0$ en los toques del intervalo de velocidad permitido para $m_0 \neq 0$. Los ceros de la función u delimitan condiciones físicas específicas.

Entre medio de los topes resulta $u > 0$. Los conceptos físicos permiten esperar que u tenga un máximo en esa región. Esto debería verificarse resolviendo a (22) .

4. Mejor que conclusión, invitación

El máximo de u corresponde a una velocidad determinada, cuyo valor se calcula resolviendo a (22). Simbolicemos v_q a esa velocidad. ¿Qué se puede opinar de lo hecho después de la definición (8) ? ¿Complica inútilmente los cálculos o es el primer paso de algo interesante? Me gustaría calcular v_q y después hacer experimentos acelerando partículas hasta esa velocidad precisa, para observar detalles del comportamiento. Soñemos un poco. ¿Qué ocurriría en caso de estar u relacionada con el grado de saturación para interactuar con el entorno? Una partícula completamente saturada estaría inhibida para interactuar. Atravesaría el medio por donde transita sin intercambiar nada con él. El medio no actuaría sobre la partícula, ni la partícula sobre el medio. Sería un tránsito perfectamente inercial, sin oposición del medio, a velocidad constante y en forma indetectable. Soñemos más. Un conjunto de partículas en esa condición permanecería dentro del universo como materia indetectable. Materia normal en un estado especial, que no permite detectarla por medios convencionales. Ideas de ese estilo ejemplifican las razones para sentir curiosidad respecto al significado de u y al comportamiento de la materia en el estado v_q .

Iterando numéricamente, con la ecuación (22) obtuve un valor δ exacto hasta 15 decimales. El décimosexto decimal (último de la cifra mostrada) es levemente impreciso.

$$\delta_q = 0,508554724060375(5) \quad (23)$$

Aplicando ese valor a (19) obtenemos con la calculadora

$$\frac{v^2}{C^2} = 0,56058198122474604851481204822425 \quad (24)$$

Radizando tenemos

$$\frac{v}{C} = 0,7487202289405... \quad (25)$$

Esto significa que la función u adquiere su valor máximo cerca de $v = \frac{3}{4} C$. ¿Hay evidencia empírica de algo interesante que ocurra en esa condición ? Ese tipo de evidencia, en caso de existir, sería otro motivo para investigar el desarrollo iniciado en la definición (8).

He dado a este artículo un estilo distendido, acorde con la sencillez del tema. Por eso evitaré agregar en el final referencias bibliográficas, citas, lecturas recomendadas, etc. Simplemente me gustaría recibir noticias de alguien que resuelva formalmente la ecuación (22). Mi correo electrónico es carloschiappini@hotmail.com

Gracias.