

## INECUACIONES

☑ **Desigualdad:** se llama **desigualdad** a toda relación entre expresiones numéricas o algebraicas unidas por uno de los cuatro signos de desigualdad  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$ .

☑ **Inecuaciones de primer grado con dos variables:** son aquellas en las que las variables que intervienen están elevadas a un exponente igual a la unidad.

✓ **Expresión general:** son de la forma  $ax + by < c$  y todas sus equivalentes  $ax + by \leq c$ , o  $ax + by > c$ , etc. ...

➤ Representan zonas del plano, o dividen al plano en zonas.

☑ **Método de resolución:** se trata en el fondo de ecuaciones de rectas o parábolas que debemos resolver y luego analizar las zonas del plano en que se cumple la desigualdad inicial.

✓ Para las **inecuaciones de la forma**  $ax + by < c$ , pasamos primero a la ecuación lineal  $y = mx + b$ , despejando de modo adecuado. Ésta no es más que la ecuación de una recta en el plano, la cual divide al mismo en dos semiplanos. Uno de esos semiplanos contiene los puntos tales que  $y > mx + b$  y el otro los puntos tales que  $y < mx + b$ . Se trata pues de determinar qué puntos son los que cumplen la desigualdad o inecuación previa. Para ello:

➤ **Dibujamos la recta**, una vez dibujada tomamos un punto  $x$  del eje de abscisas cualquiera y trazamos la perpendicular por el mismo. El punto en que ésta corta a la recta es tal que  $y = mx + b$ , prolongando la perpendicular encontraremos los puntos tales que  $y > mx + b$ , y por debajo estarán los que cumplen que  $y < mx + b$ .


• **Ejemplo\_1:** sea la inecuación  $2x + y > 4$ . Pasamos a la ecuación de la recta  $y = -2x + 4$ , la cual dibujamos dando valores a  $x$  e  $y$ .

☒ 

$x$	$y$
$0$	$4$
$2$	$0$

 con estos dos puntos es suficiente, ya que por dos puntos pasa una y solo una recta.


☒ Trazamos una recta vertical por un punto cualquiera del eje de abscisas. El punto en que ésta corta a la recta la ordenada y cumple la ecuación de la misma, es decir  $y = r$ , un punto por encima es mayor y uno por debajo es menor. Como nuestra inecuación, despejada la  $y$ , es  $y > -2x + 4$ , los puntos que la cumplen son los del semiplano sombreado. La recta no está incluida por ser la desigualdad estricta.



- **Ejemplo\_2:**  $2x + y \leq 4$ , es similar al anterior, solo cambia el sentido de la desigualdad y el hecho de que ahora no es estricta. Pasamos a la ecuación  $y = -2x + 4$ , igual que antes. Damos valores a  $x$  e  $y$  para dibujarla:

$x$	$y$
$0$	$4$
$2$	$0$

 la dibujamos y procedemos como antes. Ahora la recta está incluida en la solución.



**Sistemas de inecuaciones mixtas con dos variables:** son sistemas formados por una inecuación de primer grado y dos variables con otra de primer grado, también con dos variables. O bien ambas de segundo grado. O bien una de cada.

✓ **Sistemas de dos ecuaciones y dos variables de primer grado:** son de la forma

$$\begin{cases} a_1x + b_1y < c_1 \\ a_2x + b_2y > c_2 \end{cases}, \text{ o cualquiera de sus variaciones.}$$

➤ **Método de resolución:** dibujamos ambas rectas por separado. Buscamos los semiplanos que cada recta produce en el plano, y por último buscamos las zonas de intersección de ambos, o los puntos del plano que cumplen ambas desigualdades simultáneamente.




### Ejemplo 1

Resolver el siguiente sistema de inecuaciones :  $\begin{cases} x - y > 4 \\ 3x + 2y < 3 \end{cases}$


Resolvemos gráficamente cada una de la inecuaciones de que consta.

La solución será la intersección gráfica de las distintas regiones solución.


1.  $x - y > 4$  representamos la recta  $y = x - 4$  y vemos la región solución. Figura 4.
2.  $3x + 2y < 3$  representamos la recta  $y = \frac{-3x+3}{2}$  y vemos la solución. Figura 5.
3. La solución del sistema será la zona que cumpla las soluciones de las dos. Figura 6.




- Ejemplo\_1:  $\begin{cases} x + y \geq 5 \\ 2x - y < -2 \end{cases}$



• Ejemplo\_2: 
$$\begin{cases} 4x + y \leq 20 \\ y \leq 8 \\ x + 2y \geq 12 \end{cases}$$



• Ejemplo\_3: 
$$\begin{cases} 4x + 3y \leq 12 \\ x + 2y \leq 6 \\ x + y \leq 5 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$



Actividad  
des de  
aplicación.  
n.

P1.- Resolver las siguientes inecuaciones con dos incógnitas:

a)  $x - 2y < 5 \Rightarrow$       b)  $\frac{2y-3}{2} \leq \frac{x-1}{3} \Rightarrow$       c)  $3x + 2y + 5 \leq 0 \Rightarrow$   
d)  $3x - 2y < 2 \Rightarrow$       e)  $2x - 3y \leq 0 \Rightarrow$       f)  $(x-3) \cdot (x-1) \leq y \Rightarrow$

$$g) (x-1) \cdot (x+2) \leq y \Rightarrow \quad h) x^2 - 4x + 3 > y \Rightarrow \quad i) -x + 2 \geq -y \Rightarrow$$

P2.- Resolver los siguientes sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas:

$$a) \begin{cases} x + y \leq 3 \\ 3x - 3y \leq 9 \end{cases} \Rightarrow \quad b) \begin{cases} x + y \leq 3y - 8 \\ y \geq 2x + 4 \end{cases} \Rightarrow \quad c) \begin{cases} x - y + 2 \geq 0 \\ x - 1 \leq y \end{cases} \Rightarrow$$

$$d) \begin{cases} x - 3y + 2 < 0 \\ 2x + y - 3 > 0 \\ x + 4y - 12 < 0 \end{cases} \Rightarrow \quad e) \begin{cases} x \geq y \\ x + y \geq 0 \\ 2x - y + 2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \quad f) \begin{cases} y \leq 8 \\ 4x + y \leq 20 \\ x + 2y \geq 12 \end{cases} \Rightarrow$$

$$g) \begin{cases} 4x + 3y \leq 12 \\ x + 2y \leq 6 \\ x + y \leq 5 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \quad h) \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 12 \\ 4x + 9y \leq 30 \end{cases} \Rightarrow \quad i) \begin{cases} 1 - x < 2 - 3x \\ 3 + x < 2 + 5x \end{cases} \Rightarrow$$

$$j) \begin{cases} \frac{x-1}{3} - \frac{x+3}{2} \leq x \\ \frac{4x-2}{4} - \frac{x-1}{3} \geq x \end{cases} \Rightarrow \quad k) \begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ y > x \\ x + 2y \leq 12 \end{cases} \Rightarrow \quad l) \begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ y < 2 - x \\ y < x + 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$m) \begin{cases} x - 3y + 2 < 0 \\ 2x + y - 3 > 0 \\ x + 4y - 12 < 0 \end{cases} \Rightarrow \quad n) \begin{cases} x \geq y \\ x + y \geq 0 \\ 2x - y + 2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \quad o) \begin{cases} -2 < x < 2 \\ y > 4 \\ x + y - 1 < 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$p) \begin{cases} x - 3y + 2 > 0 \\ 2x + y - 3 < 0 \\ x + 2y + 4 > 0 \end{cases} \Rightarrow \quad q) \begin{cases} x - 2y + 3 \geq 0 \\ x + 2y - 3 \leq 0 \\ -3x + y - 3 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \quad r) \begin{cases} x + 2y - 7 \geq 0 \\ 2x - 3y \geq 0 \\ 2x - y - 4 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow$$

**Desigualdad:** se llama **desigualdad** a toda relación entre expresiones numéricas o algebraicas unidas por uno de los cuatro signos de desigualdad,  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$

✓ **Por ejemplo:**

➤  $4 + 6 < 10$  ;  $(x-1) \cdot (x-2) \geq 0$  ;  $1 + 4 < 8$ , etc. ...

✓ **Las desigualdades**, al igual que las igualdades **pueden ser ciertas o falsas**, así, en los ejemplos:

➤ la **primera es falsa**, la **segunda depende** del valor que le demos a  $x$ , y la **tercera es verdadera**.

✓ **Las desigualdades en las que interviene una variable se denominan inecuaciones.**

**Propiedades de las desigualdades:**

✓ **Se denominan también transformaciones de equivalencia.**

➤ **Suma:** si a los dos miembros de una desigualdad se les suma o resta una misma expresión o cantidad, la desigualdad no varía:

$$\bullet a < b \Rightarrow a + c < b + c$$

➤ **Transposición:** consiste en restar a ambos miembros de la desigualdad una misma cantidad, pero de modo que uno de los términos de uno de los miembros desaparezca del mismo y aparezca en el otro miembro:

$$\bullet \underbrace{a + b}_{\text{Origen}} > c \Rightarrow a + b - b > c - b \Rightarrow \underbrace{a}_{\text{Transposición}} > c - b$$

➤ **Producto:** Si se multiplican los dos miembros de una desigualdad por una cantidad positiva, la desigualdad no varía, pero si la cantidad es negativa, entonces cambia el sentido de la desigualdad:

•  $a < b \Rightarrow -a > -b$ , **al multiplicar por una cantidad negativa cambia el sentido de la desigualdad.**

•  $a > b, c > 0 \Rightarrow a \cdot c > b \cdot c$ , si la cantidad es positiva se conserva el sentido original de la desigualdad.

➤ **Simplificación:** si se dividen los dos miembros de una desigualdad por una cantidad no negativa y distinta de cero, la desigualdad no varía:

•  $a \cdot c \geq b \cdot c, y c > 0 \Rightarrow \frac{a \cdot c}{c} \geq \frac{b \cdot c}{c} \Rightarrow a \geq b$

•  $\left\{ \begin{array}{l} -a \leq b \Rightarrow a \geq -b, \text{ ya que } -2 \leq 3 \Rightarrow 2 \geq -3 \end{array} \right.$

•  $\left\{ \begin{array}{l} -a \leq b \Rightarrow -7 \cdot a \leq 7 \cdot b \Rightarrow \frac{-7 \cdot a}{-7} \geq \frac{7 \cdot b}{-7} \Rightarrow a \geq -b \end{array} \right. \Rightarrow$ , si el divisor es negativo entonces

cambia el sentido de la desigualdad.

☑ **Inecuaciones:** son desigualdades en las que se encuentra presente en uno cualquiera de los miembros, o en ambos, una o más variables, o incógnitas.

✓ **Una inecuación se verifica solo para algunos valores de las variables.**

➤ **Los valores numéricos** para los cuales se verifica la desigualdad **son las soluciones** de la misma.

➤ **Resolver una inecuación** consiste en hallar los valores numéricos para los cuales la desigualdad es verdadera.

✓ **Inecuaciones equivalentes**, son aquellas que tienen las mismas soluciones.

➤ Para hallar inecuaciones equivalentes debemos aplicar los **principios de equivalencia:**

• **Si sumamos o restamos** a los miembros de una inecuación **una misma cantidad** o expresión algebraica, **la inecuación que resulta es equivalente a la dada.**

• **Si multiplicamos o dividimos** los dos miembros de una inecuación **por una misma cantidad positiva y no nula**, **la inecuación que resulta es equivalente a la dada.**

• **Si multiplicamos o dividimos** los dos miembros de una inecuación **por una misma cantidad negativa**, **la inecuación que resulta es de sentido contrario a la dada.**

• **Ejemplos:**

☒  $x - 2 \leq 3x - 5 \Rightarrow x - 2 - x + 5 \leq 3x - 5 - x + 5 \Rightarrow 3 \leq 2x$ , es una inecuación equivalente a la primera.

☒  $\frac{3}{2}x + 1 > 2x - \frac{4}{3} \Rightarrow 6 \cdot \left(\frac{3}{2}x + 1\right) > 6 \cdot \left(2x - \frac{4}{3}\right)$ , operando nos queda,  $9x + 6 > 12x - 8$ ,

que es equivalente a la dada, y por último  $-9x - 6 < -12x + 8 \Rightarrow 12x - 9x < 8 + 6$ , y de ahí pasaríamos a otras inecuaciones equivalentes hasta llegar a la solución, en este caso

$3x < 14 \Rightarrow x < \frac{14}{3}$ , que es la solución, es decir, todos los valores de la variable menores que

catorce tercios.

☑ **Inecuaciones de primer grado:** son aquellas en las que las variables que intervienen están elevadas a un exponente igual a la unidad.

✓ **Inecuaciones de primer grado con una incógnita**, tienen por expresión general

**$ax + b < 0$** , y todas sus equivalentes.

$ax + b \leq 0$ ;  $ax + b > 0$ ;  $ax + b \geq 0$ .

➤ **Ejemplos:**

• **E1.-**  $99x - 109 \leq 0 \Rightarrow x \leq \frac{109}{99} \Rightarrow \forall x \in \left(-\infty, \frac{99}{109}\right]$ , es decir, se cumple para todo valor

de la variable x menor o igual que noventa y nueve centonueveavos.

- **E2.-**  $17x - 15 > 0 \Rightarrow x > \frac{15}{17} \Rightarrow \forall x \in \left(\frac{15}{17}, \infty\right)$ , es decir, se cumple para todo valor de la variable estrictamente mayor que quince diecisieteavos.

➤ Luego para resolver una inecuación se sigue un proceso similar al de resolver ecuaciones.

✓ **Método analítico:**

➤ Para **resolver una inecuación de primer grado**, lo primero que hay que hacer es llegar a obtener la expresión general de una inecuación de 1<sup>er</sup> grado del apartado anterior aplicando los principios de equivalencia y los fundamentos del cálculo en general:

➤ **Quitar paréntesis** si los hubiera. Para ello **aplicar la propiedad distributiva** del producto respecto a la suma.

➤ **Quitar denominadores** si los hubiera. Para ello **reducir ambos miembros** a común denominador.

➤ **Reducir términos semejantes** en ambos miembros.

➤ Pasar a un miembro los términos que contengan la variable y al otro los que no la contengan, y volver a reducir términos. (Aplicar los **principios de equivalencia de inecuaciones**)

➤ **Despejar la variable.** (Volver a aplicar los **principios de equivalencia** de modo que la variable quede aislada en el 1<sup>er</sup> miembro y con coeficiente la unidad, 1)

➤ **IMPORTANTE:** si al aplicar los principios de equivalencia debemos **dividir o multiplicar** por una **cantidad negativa** tener presente que **cambia el sentido de la desigualdad**, así:

•  $36 - 46x \geq 378x - 315 \Rightarrow -46x - 378x \geq -36 - 315 \Rightarrow 424x \leq 351$  ya que hemos tenido que multiplicar por  $-1$  ambos miembros por ser éstos negativos, luego proseguiríamos de modo normal.

✓ **Ejemplos:**

➤ **E1.-**  $4x - 7 < x + 2 \Rightarrow 4x - x < 2 + 7 \Rightarrow 3x < 9 \Rightarrow x < 3 \Rightarrow \forall x \in (-\infty, 3)$ , la solución son todos los valores de la variable menores estrictamente que 3.

➤ **E2.-**  $\frac{3}{2}x + 1 > 2x - \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{9x + 6}{6} > \frac{12x - 8}{6} \Rightarrow 9x - 12x > -8 - 6$ , como nos queda la variable negativa debemos multiplicar ambos miembros por  $-1$ , así

$-3x > -14 \Rightarrow 3x < 14 \Rightarrow x < \frac{14}{3} \Rightarrow \forall x \in \left(-\infty, \frac{14}{3}\right)$ , la solución son todos los valores de

la variable estrictamente menores que catorce tercios.


✓ **Modo de dar las soluciones:**

➤ **Por intervalos**, como en los ejemplos anteriores.


➤ **Gráficamente**, por su representación en la recta real.

• En los casos anteriores sería:

• E1.-



• E2.-



☑ **Sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita:** son aquellos en los que la única variable que interviene en todas las ecuaciones está elevada a un exponente igual a la unidad.


✓ **Sistemas de dos ecuaciones, tienen por expresión general:**

➤  $\begin{cases} a_1x < b_1 \\ a_2x < b_2 \end{cases}$ , y todas sus equivalentes  $\begin{cases} a_1x < b_1 \\ a_2x > b_2 \end{cases}$ ,  $\begin{cases} a_1x \leq b_1 \\ a_2x \geq b_2 \end{cases}$ , etc. ...

✓ **Técnicas de resolución:** no existe más que un modo de resolverlos, independientemente del número de inecuaciones que compongan el sistema, se resuelve cada inecuación por separado, y al final se busca la solución en la intersección de todas ellas, es decir, el intervalo de solución común a todas.

➤ **Ejemplos:**

- **E1.-**  $\begin{cases} x + 2 > 1 \\ 2x - 5 \leq x + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x \leq 9 \end{cases}$ , los intervalos de solución son  $(-1, \infty)$  para la primera y  $(-\infty, 9]$  para la segunda. Luego la solución común a ambas está en la intersección de ambos, es decir, en  $(-1, 9]$ , gráficamente tal vez se vea mejor.




- **E2.-** Sea  $x$  el largo de un rectángulo de 3 cm. de ancho, el lado de un triángulo equilátero y el lado de un cuadrado. Determinar su valor para que el perímetro de rectángulo sea superior al del triángulo e inferior al del cuadrado.

☒ El planteamiento nos lleva a  $3x < 2x + 6 < 4x$ . Esta es una inecuación de primer grado que no podemos resolver directamente. Debemos pasar al sistema  $\begin{cases} 3x < 2x + 6 \\ 2x + 6 < 4x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 6 \\ x > 3 \end{cases}$ ,

la primera tiene por solución el intervalo  $(-\infty, 6)$ , y la segunda  $(3, \infty)$ , luego la solución común es la intersección de ambos, es decir  $(3, 6)$ . Ver la solución gráfica.

☒ **Inecuaciones en valor absoluto:** son aquellas en las que parte de la inecuación, o toda ella, viene afectada por el valor absoluto de la misma.



✓ **Expresión general:**  $|ax + b| \leq c$ , o todas sus equivalentes  $|ax + b| \geq c$ , o  $|ax + b| > c$ , etc. ...

✓ **Método de resolución:** aplicamos la definición de valor absoluto de una cantidad y pasamos a un sistema de dos ecuaciones cuya solución es la solución de la inecuación.

➤  $|ax + b| \leq c$  por definición  $\begin{cases} ax + b \leq c \\ -(ax + b) \leq c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax + b \leq c \\ ax + b \geq -c \end{cases}$ , recuerda que al multiplicar los

dos miembros de una desigualdad por una cantidad, negativa, cambia el sentido de la desigualdad.

➤ **Ejemplos:**

• **E1.-**  $|2x - 1| < 2 \Rightarrow \begin{cases} 2x - 1 < 2 \\ -(2x - 1) < 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x < 3 \\ 2x - 1 > -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < \frac{3}{2} \\ x > -\frac{1}{2} \end{cases}$ , para la primera la

solución es el intervalo  $(-\infty, \frac{3}{2})$  y para la segunda  $(-\frac{1}{2}, \infty)$ , la solución de la inecuación inicial será la intersección de ambos, es decir, el intervalo  $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ .

• **E2.-**  $\left| \frac{2x+1}{x-2} \right| \geq 5 \Rightarrow \begin{cases} \frac{2x+1}{x-2} \geq 5 \\ -\left(\frac{2x+1}{x-2}\right) \geq 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x+1 \geq 5x-10 \\ 2x+1 \leq -5x+10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq \frac{11}{3} \\ x \leq \frac{9}{7} \end{cases}$ , la solución de la

primera es  $(-\infty, \frac{11}{3}]$  y la de la segunda  $(-\infty, \frac{9}{7}]$ , la solución de la inecuación inicial es la intersección de ambas, ten en cuenta que  $\frac{9}{7} < \frac{11}{3}$ , luego es  $(-\infty, \frac{9}{7}]$ .

**Inecuaciones factorizadas o de grado mayor que 1:** son inecuaciones en las que la variable está elevada a un exponente mayor que la unidad.

✓ **Expresión general:** son todas del tipo  $ax^2 + bx + c < 0$ , o bien cualquier otro polinomio de grado mayor y distinta desigualdad, por ejemplo mayor que u otra.

✓ **Método de resolución:** descomponer factorialmente el polinomio, aplicando Ruffini, complitud de cuadrados, etc. ... el método que consideres más apropiado o que mejor te resulte.

✓ **Ejemplos:**

➤ **E1.-**  $2x^2 < 3 - 5x$ , pasamos todos los término a un único miembro, el que más te interese, en este caso lo haremos al primero, así:

•  $2x^2 + 5x - 3 < 0$ , ahora descomponemos el polinomio que nos resulte, en este caso

$$2x^2 + 5x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 24}}{4} = \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} \\ x_2 = -3 \end{cases} \Rightarrow (x - \frac{1}{2}) \cdot (x + 3), \text{ y pasamos a la}$$

inecuación  $2 \cdot (x - \frac{1}{2}) \cdot (x + 3) < 0$ , que podemos leer como, ¿Cuándo el producto de dos números es negativo?. Digo dos ya que el signo del factor 2 es siempre el mismo y positivo, no va a influir en el resultado final. La respuesta es cuando ambos tienen signos contrarios. ¿Cómo averiguar el signo de un binomio?.

Una expresión de primer grado en x no es más que la ecuación de una recta, en este caso se trata de dos rectas  $r_1 \equiv y = x - \frac{1}{2}$ , y  $r_2 \equiv y = x + 3$ . Sabemos, o deberíamos saber que si

la pendiente de la recta es positiva ésta toma valores positivos a la derecha del punto de corte con el eje de abscisas, y negativos a su izquierda. En nuestro caso ambas tienen pendiente positiva, ¿Porqué?. Porque el coeficiente de la x es precisamente la pendiente de la recta y ambos son positivos. Los puntos de corte con el eje de abscisas son los valores de x que

hacen que  $y = 0$ , en nuestro caso son  $\frac{1}{2}$  y  $-3$ , luego  $(x - \frac{1}{2})$  toma valores positivos a la

derecha de  $\frac{1}{2}$  y  $(x + 3)$  a la derecha de  $-3$ , así:

Luego la solución será el intervalo indicado, donde el signo del producto es negativo.

Como la desigualdad es estricta, el intervalo será abierto  $(-3, \frac{1}{2})$ .

➤ **E2.-**  $x^3 - 2x^2 \leq -x^2 + 2x \Rightarrow x^3 - x^2 - 2x \leq 0$ , descomponiendo factorialmente

$x^3 - x^2 - 2x = x \cdot (x^2 - x - 2) = x \cdot (x + 1) \cdot (x - 2)$ , y pasamos a la inecuación

$x \cdot (x + 1) \cdot (x - 2) \leq 0$ . En este caso tenemos tres factores, y por lo tanto, tres rectas a

estudio. Haciendo lo mismo de antes:

Ahora la solución, además de los intervalos, por no ser una desigualdad estricta, debemos incluir los extremos de los mismos, así, la solución será

$(-\infty, -1] \cup [0, 2]$ .

**Inecuaciones fraccionarias:** son inecuaciones en las que tenemos una fracción algebraica formando parte de la misma.

✓ **Expresión general:** son del tipo  $\frac{ax + b}{cx + d} \leq 0$ , o todas sus equivalentes  $\frac{ax + b}{cx + d} \geq 0$ , o

$\frac{ax + b}{cx + d} < 0$ , etc. ... y de grados

mayores que uno.

✓ **Método de resolución:** descomponer factorialmente los polinomios numerador y denominador, aplicando Ruffini,

	-2	0	1	
x	—	—	+	+
x+2	—	+	+	+
x-1	—	—	—	+
Producto	—	+	—	+
	No es solución	Solución	No es solución	Solución

completitud de cuadrados, etc. ... el método que consideres más apropiado o que mejor te

	-3	$\frac{1}{2}$	
$x - \frac{1}{2}$	—	—	+
x+3	—	+	+
Producto	+	—	+
	No es solución	Solución	No es solución

resulte. Una vez descompuestos **nunca simplificar** ya que podríamos perder soluciones. Posteriormente **se procede como con las inecuaciones de grado mayor que uno**, ya que se trata en el fondo de averiguar el signo final que va a tener un cociente de productos de binomios.

✓ **Ejemplos:**

➤ **E1.-**  $\frac{x + 2}{x \cdot (x - 1)} > 0$ , en este caso ya tenemos el numerador y el denominador

descompuestos en factores, solo hay que construir la tabla de los signos, así:

Al tratarse de una desigualdad estricta no se incluyen los límites o extremos de los intervalos en la misma, así pues la solución será  $(-2, 0) \cup (1, \infty)$ .

	-1	0	2	
x	—	—	+	+
x+1	—	+	+	+
x-2	—	—	—	+
Producto	—	+	—	+
	Solución	No es solución	Solución	No es solución

➤ **E2.-**

$\frac{x + 1}{x - 1} < 1 \Rightarrow \frac{x + 1}{x - 1} - 1 < 0$ ,

ojo, si pasamos multiplicando el denominador al otro

miembro estaríamos cometiendo un error. Resuelve por tu cuenta la inecuación  $x + 1 < x - 1$  y compara los resultados. Para nuestro caso, operando


$\frac{x+1}{x-1} - 1 < 0 \Rightarrow \frac{x+1-x+1}{x-1} = \frac{2}{x-1} < 0$ , y todo se reduce a averiguar cuál es el signo del denominador, cuándo éste es negativo, y lo es en  $(-\infty, 1)$ .

➤ **E3.-** Debemos andar con mucho cuidado a la hora de crear la tabla de signos, fijarnos bien en la pendiente real de las rectas, así, sea la inecuación  $\frac{1-x^2}{x+1} \geq 0 \Rightarrow \frac{(x+1) \cdot (1-x)}{(x+1)} \geq 0$ ,

recuerda, no simplificar.

Como el segundo factor del numerador tiene la pendiente negativa cambian los signos respecto al punto de corte, así en este caso es todo al revés de antes, a la derecha negativa y a la izquierda positiva. La solución, por tratarse de una desigualdad no estricta, es  $(-\infty, 1]$ .

☑ **Observación:** en la siguiente gráfica tienes indicados los signos que toman los valores de las rectas según sea su pendiente en función de la distancia al punto de corte con el eje de abscisas.



**Actividades de aplicación.**

P1.- Resolver las siguientes inecuaciones de primer grado:

- a)  $3 - x < 2 + 5x \Rightarrow$
- b)  $1 + x > 2 - 3x \Rightarrow$
- c)  $2 \cdot (3x - 3) > 6 \Rightarrow$
- d)  $3 \cdot (3 - 2x) < 2 \cdot (3 + x) \Rightarrow$
- e)  $2 \cdot (x + 3) + 3 \cdot (x - 1) > 2 \cdot (x + 2) \Rightarrow$
- f)  $\frac{3x - 3}{5} - \frac{4x + 8}{2} \leq \frac{x}{4} - 3x \Rightarrow$
- g)  $2 \cdot (3 + x) \geq \frac{8 + x}{3} \Rightarrow$
- h)  $\frac{x + 1}{2} - 3x \leq \frac{1 - 5x}{3} + 4 \Rightarrow$
- i)  $\frac{2x + 3}{x - 1} \leq 2 \Rightarrow$

	-1	1	
x+1	-	+	+
x+1	-	+	+
1-x	+	+	-
Producto	+	+	-
Solución	Solución	No es solución	

j)  $\frac{3x+1}{4} - \frac{1}{3} \leq \frac{3}{15} \cdot (3x+2) + \frac{4 \cdot (1-x)}{3} \Rightarrow$

$$k) \frac{3 - \frac{x}{3}}{3 + \frac{1}{2}} - x \geq \frac{3x - \frac{5}{2}}{1 - \frac{2}{3}} \Rightarrow$$

$$l) \frac{3 - \left( \frac{x-2}{4} + x \cdot \left( \frac{x-3}{2} - x \right) \right)}{2 - \frac{3}{2}} \leq (x-2) \cdot (x-3) \Rightarrow$$

P2.- Resolver las siguientes inecuaciones de grado mayor que uno o fraccionarias:

$$a) -5x^2 + 3x + 8 < 0 \Rightarrow \quad b) 25x^2 - 101x + 102 < 0 \Rightarrow$$

$$c) x \cdot (x+5) > 2x^2 \Rightarrow \quad d) \frac{2x+5}{x-4} \geq 0 \Rightarrow \quad e) \frac{-5x-6}{3x-2} \leq 0 \Rightarrow$$

$$f) (81-x) \cdot (4-x) > x+11 \Rightarrow \quad g) (x-1)^2 > 9 \Rightarrow$$

$$h) 2 \cdot (-x+1)^2 \geq -2x^2 + 3 \Rightarrow \quad i) (x^2-9) \cdot (x+1) \geq 0 \Rightarrow$$

$$j) (1-x^2) \cdot (x^2-9) \leq 0 \Rightarrow \quad k) \frac{(x-4) \cdot (x-2) \cdot (1-x)}{(x+3) \cdot (x+1)} \geq 0 \Rightarrow$$

$$l) \left| \frac{2x-4}{x+3} \right| \leq 4 \Rightarrow \quad m) \left( \frac{3x+2}{2} + 2 \right)^2 + \left( \frac{x-1}{3} - \frac{x}{2} \right) \cdot \left( \frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} \right) \geq 0 \Rightarrow$$

$$n) x^3 - 5x^2 + 6x \leq 0 \Rightarrow \quad o) (x-1) \cdot (x^2 - 4x + 3) > 0 \Rightarrow$$

$$p) (x^2-1) \cdot (x^2+1) \leq 0 \Rightarrow \quad q) x^3 - x^2 - 4x + 4 < 0 \Rightarrow \quad r) \frac{x^2-1}{x+3} \geq 0 \Rightarrow$$

$$s) (x-1)^3 \cdot (x-1)^2 \cdot (x-2) > 0 \Rightarrow \quad t) \frac{x^2-9}{x-1} \geq 0 \Rightarrow$$

$$u) \frac{(3x-1) \cdot (x^2-2x-8)}{(x^2+9) \cdot (2-5x) \cdot (x+1)} \leq 0 \Rightarrow \quad v) \frac{(x+3) \cdot \left( x - \frac{2}{5} \right)}{4-x} \leq 0 \Rightarrow$$

$$w) \frac{(x-4) \cdot (x-2) \cdot (1-x)}{(x+3) \cdot (x+1)} \geq 0 \Rightarrow \quad x) \frac{x^2-3x+2}{6-x^2+x} \leq 0 \Rightarrow$$

$$y) \frac{x \cdot (x-1) \cdot (x+3)}{(x^2-4) \cdot (x+5)} \geq 0 \Rightarrow \quad z) \frac{(x-3) \cdot (x+3) \cdot x}{(2-x) \cdot (x+1)} \leq 0 \Rightarrow$$

P3.- Resolver los siguientes sistemas de inecuaciones con una incógnita:

$$a) \begin{cases} 2x-3 > x-2 \\ 3x-7 < x-1 \end{cases} \Rightarrow \quad b) \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{x}{5} < 8 \\ \frac{x}{2} - \frac{4x}{9} < 5 \end{cases} \Rightarrow \quad c) \begin{cases} 2x-3 \leq 3x+7 \\ \frac{2x}{5} - \frac{x}{4} \geq \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow$$

$$d) \begin{cases} \frac{x-1}{3} - \frac{x+3}{2} \leq x \\ \frac{4x-2}{4} - \frac{x-1}{3} \geq x \end{cases} \Rightarrow \quad e) \begin{cases} (x-1)^2 - (x+3)^2 \leq 0 \\ x-3 \cdot (x-1) \geq 3 \end{cases} \Rightarrow$$

**INECUACIONES.**

Enviado por:

**Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.**

**“NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION”®**

[www.monografias.com/usuario/perfiles/ing\\_lic\\_yunior\\_andra\\_s\\_castillo\\_s/monografias](http://www.monografias.com/usuario/perfiles/ing_lic_yunior_andra_s_castillo_s/monografias)

Página Web: [yuniorandrescastillo.galeon.com](http://yuniorandrescastillo.galeon.com)

Correo: [yuniorcastillo@yahoo.com](mailto:yuniorcastillo@yahoo.com)

**[yuniorandrescastillosilverio@facebook.com](https://www.facebook.com/yuniorandrescastillosilverio)**

**Twitter: @yuniorcastillos**

Celular: 1-829-725-8571

Santiago de los Caballeros,

República Dominicana,

2015.

**“DIOS, JUAN PABLO DUARTE Y JUAN BOSCH – POR SIEMPRE”®**